



## Nomenclatura IFCPC 2011<sup>1</sup>

Aceita no Congresso Mundial do Rio em 5 de Julho de 2011

Presidente do Comitê de Nomenclatura: Dr. Jacob Bornstein

| Terminologia colposcópica do <b>colo uterino</b> IFCPC 2011 <sup>1</sup> |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Avaliação Geral</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Colposcopia adequada ou inadequada (especificar o motivo sangramento, inflamação, cicatriz, etc)</li> <li>•Visibilidade da junção escamocolunar: completamente visível, parcialmente visível e não visível</li> <li>•Zona de transformação Tipo 1, 2 ou 3</li> </ul>  |  |   |
| <b>Achados colposcópicos normais</b>                                     | Epitélio escamoso original <ul style="list-style-type: none"> <li>•Maduro</li> <li>•Atrófico</li> </ul> Epitélio colunar <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ectopia</li> </ul> Epitélio escamoso metaplásico <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cistos de Naboth</li> <li>•Orifícios (glândulas) abertos</li> </ul> Deciduose na gravidez |  |   |
| <b>Achados colposcópicos anormais</b>                                    | <b>Princípios gerais</b>  | <b>Localização da lesão</b> : Dentro ou fora da ZT e de acordo com a posição do relógio<br><b>Tamanho da lesão</b> :Número de quadrantes do colo uterino envolvidos pela lesão e tamanho da lesão em porcentagem do colo uterino |   |
|  | <b>Grau 1 (Menor)</b>   | Epitélio acetobranco tênue, de borda irregular ou geográfica   | Mosaico fino, Pontilhado fino   |
|  | <b>Grau 2 (Maior)</b>   | Epitélio acetobranco denso, Acetobranqueamento de aparecimento rápido, orifícios glandulares espessados  | Mosaico grosseiro, Pontilhado grosseiro<br>Margem demarcada, Sinal da margem interna<br>Sinal da crista (sobrelevado) |
|  | <b>Não específico</b>   | Leucoplasia (queratose, hiperqueratose), erosão, captação da solução de lugol: positiva (corado) ou negativa (não corado) (teste de Schiller negativo ou positivo)   |   |
| <b>Suspeita de invasão</b>   | <b>Vasos atípicos</b><br><b>Sinais adicionais:</b> vasos frágeis, superfície irregular, lesão exofítica, necrose, ulceração (necrótica), neoplasia tumoral/grosseira.   |  |   |
| <b>Miscelânea</b>  | Zona de transformação congênita, condiloma, pólipos (ectocervical/endocervical), inflamação, estenose, anomalia congênita, seqüela pós-tratamento, endometriose.  |  |   |

<sup>1</sup> Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication



International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy  
Internationale Federation für Zervixpathologie und Kolposkopie  
Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia  
Fédération Internationale de Pathologie Cervicale et Colposcopie

| Terminologia colposcópica do <b>colo uterino</b> IFCPC 2011 <sup>1</sup> - Apêndice |  |
|---|--|
| Tipos de tratamento excisional do colo uterino                                      | TIPO DE EXCISÃO 1,2,3  |
| Dimensões do espécime da excisão  | <p><b>Comprimento:</b> corresponde à distância da margem distal/externa à margem proximal/interna.</p> <p><b>Espessura:</b> distância da margem estromal à superfície do espécime excisado.</p> <p><b>Circunferência (opcional):</b> perímetro do espécime excisado.</p> |

<sup>1</sup> Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication



International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy  
 Internationale Federation für Zervixpathologie und Kolposkopie  
 Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia  
 Fédération Internationale de Pathologie Cervicale et Colposcopie

| Terminologia colposcópica da <b>vagina</b> IFCPC 2011 <sup>1</sup> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Avaliação geral</b>   | Colposcopia adequada ou inadequada (especificar o motivo sangramento, inflamação, cicatriz, etc)                            |   |
| <b>Achados colposcópicos normais</b>                               | Epitélio escamoso original <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maduro</li> <li>• Atrófico</li> </ul>                   |   |
| <b>Achados colposcópicos anormais</b>                              | <b>Princípios gerais</b>  | Terço superior/ 2 terços inferiores<br>Anterior/posterior/lateral (direito ou esquerdo)   |
|  | <b>Grau 1 (menor)</b>   | Epitélio acetobranco tênue<br>Mosaico fino<br>Pontilhado fino   |
|  | <b>Grau 2 (maior)</b>   | Epitélio acetobranco denso<br>Mosaico grosseiro<br>Pontilhado grosseiro.  |
|  | <b>Suspeita de invasão</b>  | Vasos atípicos<br><b>Sinais adicionais:</b> vasos frágeis, superfície irregular, lesão exofítica, necrose, ulceração (necrótica), neoplasia tumoral/grosseira |
|  | <b>Não específico</b>   | Epitélio colunar (adenose)<br>Captação da solução de lugol: positiva (corado) ou negativa (não corado) (teste de Schiller negativo ou positivo)               |
| <b>Miscelânea</b>  | Erosão (traumática), condiloma, pólipos, cisto, endometriose, inflamação, estenose vaginal, Zona de transformação congênita |   |

A terminologia colposcópica e clínica da IFCPC para a vulva está pendente.

<sup>1</sup> Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Prendiville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC colposcopic nomenclature. In preparation for publication